

Le délai moyen pour obtenir un diagnostic correct de TNE est de

5 à 7 ANS¹



Les TNE gastro-intestinales représentent la forme de TNE la plus fréquent,

suivies des TNE pancréatiques et pulmonaires⁴

Il existe de nombreux diagnostics erronés de TNE³

Voici quelques-uns des plus fréquents⁵

✗ Maladie de Crohn
✗ Ménopause

✗ Syndrome du côlon irritable (SCI)
✗ Gastrite



Aussi bien les hommes que les femmes peuvent être affectés²

Vivre avec des TNE

Informations et soutien sur les tumeurs neuroendocrines

L'âge moyen du diagnostic est de

50 à 60 ANS²



Les symptômes peuvent survenir en tandem³

Voici quelques combinaisons fréquentes

Diarrhée + Bouffées de chaleur

Crampes de l'estomac/
Douleurs abdominales

Sibilances + Douleurs abdominales

Sibilances + Palpitations


Le saviez-vous?

Les TNE sont rares
SEULS 2% de tous les cancers³ sont diagnostiqués comme des TNE²



livingwithnets.com/fr-be -est la page d'information et de support sur les tumeurs neuroendocrines

Les TNE peuvent se développer plus lentement que de nombreux autres cancers



mais elles peuvent également être très agressives^{3,4}

Références: 1. Modlin IM, et al. J Natl Cancer Inst 2008;100(18):1282-89. 2. Oronsky B, et al. Neoplasia. 2017;19(12):991-1002. 3. Mamikunian G, et al. Neuroendocrine-Tumors - 4th-Edition. Inglewood, CA: Inter Science Institute; 2009. 4. Warner R. A review of carcinoid cancer. The Carcinoid Foundation. July 2012 (updated). <https://www.carcinoid.org/for-patients/general-information/a-review-ofcarcinoid-cancer/>. Accessed May 2018. 5. NET Cancer Day. Why are NET cancers so often misdiagnosed? <http://netcancerday.org/learn-more/diagnosis-and-misdiagnosis-2/why-so-oftenmisdiagnosed/> Accessed May 2018.