

Het gemiddeld



duurt om een juiste diagnose van NET te krijgen? ¹



Gastro-intestinale NET is de meest voorkomende vorm van NET, gevolgd door pancreas- en long-NET⁴


NET worden vaak verkeerd gediagnosticeerd³

Dit zijn enkele van de meest voorkomende verkeerde diagnoses.⁵

- ✗ Ziekte van Crohn
- ✗ Menopauze
- ✗ Prikkelbaredarmsyndroom (PDS)
- ✗ Gastritis



Mannen en vrouwen allebei getroffen kunnen worden? ²



Leven met NET

Informatie en ondersteuning bij neuro-endocriene tumoren

Wist u dat...

NET komen niet vaak voor

SLECHTS **2%**

van alle kankers³ wordt gediagnosticeerd als NET²



livingwithnets.com/nl-be -de thuispagina met informatie en ondersteuning voor neuro-endocriene tumoren

De gemiddelde leeftijd bij de diagnose

50-60
JAAR is?²




Symptomen per twee kunnen optreden? ³

Hier volgen enkele vaak voorkomende combinaties.

- Diarree + Opvliegers
- Maagkrampen/buikpijn + Diarree
- Piepende ademhaling + Buikpijn
- Piepende ademhaling + Hartkloppingen

NET kunnen langzamer groeien dan veel andere kankers



maar ze kunnen ook erg agressief zijn ^{3,4}

Referenties: 1. Modlin IM, et al. J Natl Cancer Inst 2008;100(18):1282-89. 2. Oronsky B, et al. Neoplasia. 2017;19(12):991-1002. 3. Mamikunian G, et al. Neuroendocrine-Tumors - 4th-Edition. Inglewood, CA: Inter Science Institute; 2009. 4. Warner R. A review of carcinoid cancer. The Carcinoid Foundation. July 2012 (updated). <https://www.carcinoid.org/for-patients/general-information/a-review-of-carcinoid-cancer/>. Accessed May 2018. 5. NET Cancer Day. Why are NET cancers so often misdiagnosed? <http://netcancerday.org/learn-more/diagnosis-and-misdiagnosis-2/why-so-often-misdiagnosed/>. Accessed May 2018.